

Lijst van werkzame bestanddelen in producten die in aanmerking kunnen komen voor algemene verkoop (AV) door middel van een versnelde administratieve afhandelingsprocedure

Lijst vastgesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
d.d. 26 september 2024 – Volgnr. 25

Naar gelang het bestanddeel gelden bepaalde voorwaarden en opmerkingen. In geval er in onderstaande tabel wordt gesproken over tabletten dan kan dit ook worden gelezen als iedere andere vaste immediate release orale toedieningsvorm in overeenkomende sterkte.

Stof	Voorwaarden
Acetylcysteine	geen
Aciclovir	uitsluitend als crème
Alginaat	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Alginezuur	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Aluminiumhydroxide	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Aluminiumoxide	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Ambroxolhydrochloride	Uitsluitend als zuigtablet; maximaal 42 tabletten; maximaal 20 mg/tablet
Ammoniakale anijsspiritus	uitsluitend als bestanddeel in hoestsiroop
Amylmetacresol	uitsluitend als bestanddeel in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol ; maximaal 84 tabletten; maximaal 0,6 mg/tablet
Artisjokbladeren, Paardebloemkruid en - wortels Boldo bladeren Mariadistelvruchten	Uitsluitend tabletten; maximaal 60 stuks; uitsluitend als de volgende combinatie: Artisjokbladeren (230 mg 65% v/v ethanolextract, 1:30-31) Paardebloemkruid en -wortels (60 mg 51% v/v ethanolextract, 1:17-18) Boldo bladeren (35 mg 70% v/v ethanolextract, 1:10-11) Mariadistelvruchten (160 mg 58% v/v ethanolextract, 1:2.0-2.1)

Ascorbinezuur	geen
Azelastine hydrochloride	uitsluitend als neusspray; uitsluitend voor de behandeling van hooikoorts
Bamipine dilactaat	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 20 g
Bastaardsmeerwortel	Uitsluitend als creme; maximaal 50 g; uitsluitend indien 10 gram creme 1 gram extract van de Bastaardsmeerwortel bevat, waarbij voor dit extract de volgende combinatie geldt: 0,4 g perssap van de verse planten DER 3-8:1 0,6 g 30% ethanol (v/v) extract DER 3-10:1
Benzydamine hydrochloride	uitsluitend in zuigtabletten en crème; maximaal 21 tabletten; maximaal 3 mg/tablet
Broomhexine hydrochloride	geen
Cadexomeerjodium	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g
Calcium (ca²⁺)	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte
Calciumcarbonaat	voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte en de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Calciumgluconaat 1-water	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte
Capsicum extract	uitsluitend als dermale crème
Carbocisteine	uitsluitend als hoestmiddel
Cetirizine dihydrochloride	uitsluitend tabletten. uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 6jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet
Chloorhexidine digluconaat	uitsluitend als oplossing voor cutaan gebruik, met of zonder ethanol; maximaal 30 ml

Clotrimazol	Als crème: Voor toepassing op de huid bij de behandeling van dermatomycosen veroorzaakt door dermatofyten (Trichophyton-soorten), gisten (Candida-soorten) en overige schimmels (Malassezia furfur). Niet voor vaginale toepassing. Als strooipoeder: Uitsluitend voor toepassing op de voet als adjuvante behandeling van Tinea pedis (voetschimmel) veroorzaakt door dermatofyten (Trichophyton-soorten).
Coffeine	uitsluitend in combinatie met paracetamol; maximaal 50 mg/tablet; zie verder voorwaarden bij paracetamol
Cromoglycaat dinatrium	geen
Dequalinium dichloride	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 42 tabletten; maximaal 0,25 mg/tablet
Dichloorbenzylalcohol	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 84 tabletten; maximaal 1,2 mg/tablet
(Es)omeprazol	uitsluitend tabletten; uitsluitend voor volwassenen; maximaal 7 tabletten; maximaal 20mg/tablet.
Eucalyptus olie	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
Fexofenadine	uitsluitend tabletten; uitsluitend voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar; maximaal 120 mg per tablet; maximaal 10 tabletten
Foliumzuur	uitsluitend als aanvulling vitamine behoefte
Glucose 0-water	
Glucose 1-water	
Glycolsalicylaat	uitsluitend als wrijfmiddel
Heparinoiden	uitsluitend als hulpmiddel bij behandeling sportblessures en letsels bij ongevallen
Hexetidine	uitsluitend als mondspoeling

Histamine dihydrochloride	uitsluitend als wrijfmiddel
Honing	
Ibuprofen	Uitsluitend vaste orale toedieningsvormen van 200 mg/doseereenheid; maximaal 12 doseereenheden
Jodium	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g
Kaliumchloride	uitsluitend als ORS
Kaliumwaterstofcarbonaat	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Kamfer	uitsluitend in verkoudhoudsmiddel; niet in combinatie met menthol
Kool, geactiveerd	
Lidocaine	Bij beginnende keelpijn uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 tabletten; maximaal 1 mg/tablet, daarnaast als dentaal gebruik bij baby's Zalf voor rectaal gebruik: maximaal 18 mg/g, tot een maximum van 630 mg in totaal.
Loperamide hydrochloride	Uitsluitend voor volwassenen en kinderen >8 jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 2mg/tablet; bij kinderen uitsluitend in combinatie met ORS (deze voorwaarde dient op de verpakking te worden vermeld)
Loratadine	Uitsluitend tabletten. Uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 2 jaar; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet. Indien het doseringsvoorschrift niet uitgevoerd kan worden, dient op de verpakking vermeld te worden: "De tablet is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 30 kg.
Magnesium(sub)carbonaat	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Magnesiumhydroxide	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen

Magnesiumtrisilicaat	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
Methylnicotinaat	uitsluitend in spierbalsems/zalven
Methylsalicylaat	uitsluitend in spierbalsems/zalven
Myrteceaine	uitsluitend in wrijfmiddel
Natriumwaterstofcitraat-1,5-water	uitsluitend als ORS
Nicotine	Uitsluitend pleisters, kauwgom, zuigtabletten, orodispergeerbare film, sublinguale tabletten en spray voor oromucosaal gebruik. Voor pleisters is de maximale verpakkingsgrootte beperkt tot 6 weken gebruik. Voor kauwgom, zuigtabletten, orodispergeerbare film en sublinguale tabletten is de maximale verpakkingsgrootte beperkt tot 3 weken gebruik uitgaande van de maximale dagdosering. Voorbeeld: voor kauwgom komt dit uit op een maximum van 504 stuks per verpakking. Voor spray voor oromucosaal gebruik is de maximale verpakkingsgrootte beperkt tot 2 dagen gebruik uitgaande van de maximale dagdosering.
Nicotinamide	geen
Paracetamol	voor kinderen in zetpillen en tabletten maximaal 10 stuks en in drank/suspensie in equivalent volume; voor volwassenen max 20 tabletten en max 500 mg/tablet of max 10 zetpillen en max 1000 mg/zetpil
Penciclovir	uitsluitend als crème
Povidonjodium	uitsluitend als oplossing (zonder ethanol) voor cutaan gebruik, al dan niet op een geïmpregneerde doek; maximaal 30 ml of 50 doekjes
Pramocaine hydrochloride	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 15 g
Propyl-4-hydroxybenzoaat	uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 tabletten; maximaal 1,8 mg/tablet

Pyridoxine hydrochloride	geen
Ranitidine hydrochloride	Uitsluitend tabletten, maximaal 14 tabletten, maximaal 75 mg ranitidine /tablet
Riboflavine	geen
Saccharose	
Terbinafine	Uitsluitend als topicaal middel voor de indicatie voetschimmel (tinea pedis)
Terpentijn olie	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
Thiamine hydrochloride	geen
Thymol	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
Tijm kruid	in pastilles (in maximale verpakkingsgrootte van 40 pastilles) en hoestsiroop; niet in combinatie met menthol
Tocoferol, dl-alfa- acetaat	maximaal 100 tabletten; maximaal 50 mg/tablet
Tripelennamine hydrochloride	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 10 g
Ureum	uitsluitend in zalf/crème
Waterstofperoxide	uitsluitend als mondspoeling; uitsluitend verdund
Zinkoxide	uitsluitend voor dermaal gebruik, maximaal 100 mg/g