

Lijst van werkzame bestanddelen in producten die in aanmerking kunnen komen voor algemene verkoop (AV). Naar het gelang het bestanddeel gelden bepaalde voorwaarden en opmerkingen.

In geval er in onderstaande tabel wordt gesproken over tabletten dan kan dit ook worden gelezen als iedere andere vaste immediate release orale toedieningsvorm in overeenkomende sterkte.

stof	AV	voorwaarden	opmerkingen
Acetylcysteine	x	geen	bestanddeel in hoestmiddel
Aciclovir	x	uitsluitend als crème	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Alginaat	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Alginezuur	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Aluminiumhydroxide	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Aluminiumoxide	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Ammoniakale anijsspiritus	x	uitsluitend als bestanddeel in hoestsiroop	Bestanddeel in hoestsiroop die o.a. ook tijm en geen alcohol bevat
Amylmetacresol	x	uitsluitend als bestanddeel in zuigtabletten; uitsluitend in kindveilige verpakking; uitsluitend zonder menthol	kindveilige verpakking i.v.m. gevaar voor verslikken bij kleine kinderen; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Ascorbinezuur	x	geen	vitamine C
Azelastine hydrochloride	x	uitsluitend als neusspray; uitsluitend voor de behandeling van hooikoorts	bekend niet sederend lokaal anti-histaminicum bij hooikoorts
Bamipine dilactaat	x	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 20 g	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Benzylamine hydrochloride	x	uitsluitend in zuigtabletten en creme; zuigtabletten uitsluitend in kindveilige verpakking; creme zonder beperking.	bestanddeel in zuigtablet en wrijfmiddel; kindveilige verpakking i.v.m. gevaar voor verslikken bij kleine kinderen
Broomhexine hydrochloride	x	geen	bestanddeel in hoestmiddel
Cadexomeerjodium	x	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g	desinfectans
Calcium (ca2+)	x	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte	
Calciumcarbonaat	x	voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte en de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	
Calciumgluconaat 1-water	x	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte	
Capsicum extract	x	uitsluitend als dermale creme	wrijfmiddel
Carbocisteine	x	uitsluitend als hoestmiddel	bestanddeel in hoestmiddel
Cetirizine dihydrochloride	x	uitsluitend tabletten. uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 6jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet	bekend niet sederend anti-histaminicum bij allergische reacties
Chloorcyclizine hydrochloride	x	uitsluitend in combinatiepreparaat bij reisziekte; maximaal 10 tabletten; maximaal 25 mg/tablet	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Chloorhexidine digluconaat	x	uitsluitend als oplossing; maximaal 15 ml	desinfectans
Cinnarizine	x	uitsluitend bij reisziekte; maximaal 10 tabletten; maximaal 25 mg/tablet	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Coffeine	x	uitsluitend in combinatie met paracetamol; maximaal 50 mg/tablet; zie verder voorwaarden bij paracetamol	zie paracetamol
Cromoglycaat dinatrium	x	geen	
Cyclizine hydrochloride	x	uitsluitend bij reisziekte, maximaal 10 tabletten; maximaal 50 mg/tablet	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Dequalinium dichloride	x	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; uitsluitend in kindveilige verpakking	kindveilige verpakking i.v.m. gevaar voor verslikken bij kleine kinderen; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming

Dichloorbenzylalcohol	x	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; uitsluitend in kindveilige verpakking	kindveilige verpakking i.v.m. gevaar voor verslikken bij kleine kinderen; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Eucalyptus olie	x	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol	breed gebruikt middel; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Foliumzuur	x	uitsluitend als aanvulling vitamine behoefte	een B-vitamine
Glucose 0-water	x		zie ook kaliumchloride
Glucose 1-water	x		zie ook kaliumchloride
Glycolsalicylaat	x	uitsluitend als wrijfmiddel	als bestanddeel in simpel wrijfmiddel
Heparinoiden	x	uitsluitend als hulpmiddel bij behandeling sportblessures en letsels bij ongevallen	bestanddeel in wrijfmiddel bij sportblessures.
Hexetidine	x	uitsluitend als mondspoeling	bestanddeel in desinfecterende mondspoeling
Histamine dihydrochloride	x	uitsluitend als wrijfmiddel	bestanddeel in wrijfmiddel
Honing	x		bestanddeel in o.a hoestmiddel
Jodium	x	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g	desinfectans
Kaliumchloride	x	uitsluitend als ORS	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Kaliumwaterstofcarbonaat	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Kamfer	x	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol	bestanddeel in breedgebruikt verkoudheidsmiddel; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Kool, geactiveerd	x		een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Lidocaine	x	uitsluitend als dentaal gebruik bij baby's	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Loperamide hydrochloride	x	Uitsluitend voor volwassenen en kinderen >8 jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 2mg/tablet; bij kinderen uitsluitend in combinatie met ORS (deze voorwaarde dient op de verpakking te worden vermeld)	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Loratadine	x	Uitsluitend tabletten. Uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 12 jaar en kinderen tussen 2-12 jaar met een lichaamsgewicht > 30 kg; maximaal 10 tabletten; maximaal 10mg/tablet	bekend niet sederend anti-histaminicum bij allergische reacties
Magnesium(sub)carbonaat	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Magnesiumhydroxide	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Magnesiumtrisilicaat	x	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Meclozine dihydrochloride-1-water	x	uitsluitend bij reisziekte; maximaal 10 tabletten; maximaal 12,5mg/tablet	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Methylnicotinaat	x	uitsluitend in spierbalsems/zalven	bestanddeel in wrijfmiddel
Methylsalicylaat	x	uitsluitend in spierbalsems/zalven	bestanddeel in wrijfmiddel
Myrtecaine	x	uitsluitend in wrijfmiddel	bestanddeel in wrijfmiddel
Natriumwaterstofcitraat-1,5-water	x	uitsluitend als ORS	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Nicotine	x	Uitsluitend pleisters, kauwgom en sublinguale tabletten	ter ondersteuning van het overheidsbeleid om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen
Nicotinamide	x	geen	een B-vitamine
Oxychinoline sulfaat	x	uitsluitend als mondspoeling of tablet voor oplossing; niet in combinatie met menthol; uitsluitend in kindveilige verpakking	bestanddeel in mondspoeling; kindveilige verpakking i.v.m. gevaar voor inslikken bij kleine kinderen; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming

Paracetamol	x	voor kinderen in zetpillen en tabletten maximaal 10 stuks en in drank/suspensie in equivalent volume; voor volwassenen max 20 tabletten en max 500 mg/tablet	een brede verkrijgbaarheid gewenst om daarmee het ongemak voor (kind)patiënt en consument te minimaliseren, snelle beschikbaarheid gewenst en goede doseermogelijkheden
Penciclovir	x	uitsluitend als crème	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Povidonjodium	x	uitsluitend als oplossing; maximaal 15 ml	desinfectans
Pramocaine hydrochloride	x	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 15 g	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Pyridoxine hydrochloride	x	geen	een B-vitamine
Riboflavine	x	geen	een B-vitamine
Saccharose	x		bestanddeel in hoestmiddel
Terpentijn olie	x	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol	bestanddeel in verkoudheidsmiddel; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Thiamine hydrochloride	x	geen	een B-vitamine
Thymol	x	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol	bestanddeel in verkoudheidsmiddel; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Tijm kruid	x	uitsluitend in hoestsiroop; niet in combinatie met menthol	bestanddeel in hoestmiddel; toepassing van menthol bij kinderen is een risico i.v.m. slijmvorming
Tocoferol, dl-alfa- acetaat	x	maximaal 100 tabletten; maximaal 50 mg/tablet	vitamine E; gezien risico op overdosering beperkte verpakkingsgrootte
Tripelennamine hydrochloride	x	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 10 g	een brede verkrijgbaarheid is gewenst om daarmee het ongemak voor patiënt en consument te minimaliseren
Ureum	x	uitsluitend in zalf/crème	bestanddeel in breed bekende verkoelende zalf
Waterstofperoxide	x	uitsluitend als mondspoeling; uitsluitend verdund	bestanddeel in mondspoeling

