

Onderzoek (naam, landen, gegevens)	Onderzochte personen (aantal en mediane leeftijd)	Vaccin of combinatie van vaccins
II/14	Gegevens van werkzaamheid en veiligheid in 194 volwassenen in Libanon die ouder waren dan 56 jaar.	De werkzaamheid en veiligheid bij volwassenen ouder dan 55 jaar is vergelijkbaar met volwassenen jonger dan 55 jaar.
II/09	Gegevens van 12 klinische studies over werkzaamheid 4 jaar na vaccinatie. Voor details zie: EPAR variatie nr. 9	In de bijsluiter is een waarschuwing opgenomen dat bij personen die een hoog risico hebben, mogelijk een herhalingsdosis nodig hebben.
II/45	Een studie met gegevens van 1 of 2 herhalingsdoses 1 maand na de laatste vaccinatie bij peuters.	In de bijsluiter is opgenomen wanneer er 1 of 2 doses gegeven moet worden.
II/53	In studies is aangetoond dat het gebruik van Meningokokken groep A, C, W, Y-vaccin als een booster gegeven kan worden na een eerste vaccinatie met ander Meningokokken groep A, C, W, Y-vaccin of een monovalent Meningokokken groep C-vaccin.	In de product informatie is opgenomen dat Meningokokken groep A, C, W, Y-vaccin als boostervaccin gegeven kan worden als de eerste toediening met een ander meningokokkenvaccin gegeven is.
II/074	Een studie met gegevens van gelijktijdig gebruik met een HPV-vaccin in personen van 9 tot 25 jaar.	In de product informatie is opgenomen dat Meningokokken groep A, C, W, Y-vaccin gelijktijdig gegeven kan worden met een HPV vaccin.