

Vaccin in het kort voor het **Meningokokken ACWY-vaccin**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen **4 verschillende soorten meningokokken**. De soorten A, C, W en Y.

Meningokokken zijn bacteriën die kunnen zorgen voor een ontsteking. Zoals een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking) of bloedvergiftiging. Een besmetting kan ook klachten geven die niet meer over gaan. Zoals aanvallen van epilepsie, doof zijn, minder goed kunnen concentreren en problemen met de ogen.

Een besmetting met meningokokken is ernstig en kan dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van uw kind de 4 soorten meningokokken.

Komt uw kind na de vaccinatie in contact met deze bacteriën? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die deze bacteriën dood maken.

Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Uw kind krijgt deze vaccinatie **2 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit als uw kind 14 maanden oud is en in het jaar dat uw kind 14 jaar wordt.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zieker worden.

Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.

Heeft uw kind een **lichte infectie**? Zoals een verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Het is belangrijk dat uw kind de vaccinaties tegen meningokokken krijgt. Dit is vooral belangrijk voor kinderen tussen 1 en 4 jaar en jongeren vanaf 14 jaar. Zij lopen namelijk extra risico op een besmetting met meningokokken.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt uw kind omdat dit vaccin ervoor zorgt dat de afweer van het lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen meningokokken.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Minder zin hebben in eten.
- Suf voelen.
- Koorts of hoofdpijn.
- Misselijk zijn, overgeven of diarree.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Huiduitslag.
- Pijn in de armen en benen.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met de jeugdarts of met uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl).

Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl).

Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).