

Vaccin in het kort voor het **DKT-vaccin (22 wekenprik)**

Waarvoor is dit vaccin?

Als u zwanger bent, kunt u de 22 wekenprik krijgen. Dit vaccin zorgt ervoor dat uw baby vanaf de geboorte beschermd is tegen **kinkhoest**. U bent na deze vaccinatie zelf ook een tijdje beschermd tegen kinkhoest.

Kinkhoest is een ontsteking van de neus, keel en longen. Klachten zijn onder andere veel hoesten en moeite hebben met ademen.

Dit vaccin beschermt u ook tegen bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

- **Difterie.** Dit is een ernstige ontsteking van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Dit kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.

De ziektes kinkhoest, difterie en tetanus zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent uw lichaam de bacterie die kinkhoest veroorzaakt. Uw lichaam maakt antistoffen aan die deze bacterie dood kunnen maken. Deze antistoffen komen via uw navelstreng bij uw baby.

Komt uw baby na de geboorte in contact met de bacterie die kinkhoest veroorzaakt? Dan kunnen de antistoffen die u aan uw baby heeft gegeven de bacterie snel dood maken. **Hierdoor wordt uw baby niet ziek of veel minder ziek.**

Na de vaccinatie herkent uw lichaam ook de bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

Wanneer krijg ik dit vaccin?



U krijgt dit vaccin **1 keer** per zwangerschap. U kunt de prik vanaf 22 weken zwangerschap tot aan het eind van uw zwangerschap krijgen.

Het RIVM adviseert dat u de prik zo vroeg mogelijk haalt. De kans is dan groter dat uw baby goed beschermd is tegen kinkhoest. Als u weer zwanger wordt, heeft u een nieuwe 22 wekenprik nodig.



U krijgt de prik in uw bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van **het Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes.

De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Let op!



U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.



Bent u zwanger? U kunt dit vaccin veilig krijgen als u zwanger bent.

Wat moet ik doen als ik de vaccinatie niet heb gehad?



Heeft u de afspraak voor de vaccinatie gemist? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Het is belangrijk dat u dit vaccin krijgt. Zo is uw baby vanaf de geboorte goed beschermd.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft u **koorts** voordat u de vaccinatie krijgt? U kan dan nog zieker worden.

Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als u meer dan 38,5 graden koorts heeft.

Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u eerder een **allergische reactie** heeft gehad op een vaccin.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. Ongeveer 1 op de 10 personen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Moe of slaperig zijn.
- Een ziek gevoel hebben.
- Hoofdpijn.

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Bespreek deze dan met de jeugdarts, uw verloskundige, arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Of kijk voor meer informatie op apotheek.nl, thuisarts.nl of rijksvaccinatieprogramma.nl.

Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.