Vaccin in het kort voor het **Meningokokken ACWY-vaccin (MenQuadfi)**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt je kind tegen **4 verschillende soorten meningokokken**. De soorten A, C, W en Y.

Meningokokken zijn bacteriën die kunnen zorgen voor een ontsteking. Zoals een ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking) of bloedvergiftiging. De ontsteking kan ook klachten geven die niet meer over gaan. Zoals aanvallen van epilepsie, doof zijn, minder goed kunnen concentreren en problemen met de ogen.

Een ontsteking met meningokokken is ernstig en kan dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van je kind de 4 soorten meningokokken. Komt je kind na de vaccinatie in contact met deze bacteriën? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die deze bacteriën dood maken. **Hierdoor wordt je kind niet ziek of veel minder ziek.**

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?



Je kind krijgt het meningokokkenvaccin **2 keer**. In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma is dit op de leeftijd van 14 maanden en in het jaar dat je kind 14 jaar wordt.

Het kan zijn dat je kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van je kind.



Je kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft je kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan je kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van je kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen meningokokken.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen van 6 weken tot en met 23 maanden oud krijgt last van:

- Rood, dikker of gevoelig worden van de huid op de plek van de prik.
- Prikkelbaar zijn.
- Huilen.
- Minder zin hebben in eten.
- Slaperig zijn.
- Koorts.
- Overgeven (komt minder vaak voor bij kinderen van 12 tot en met 23 maanden oud).

Ongeveer 1 op de 10 personen van 2 jaar of ouder krijgt last van:

- Hoofdpijn.
- Spierpijn.
- Een ziek gevoel.
- Pijn op de plek van de prik

Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft je kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Je kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als je kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft je kind een **lichte ontsteking**? Zoals een verkoudheid? Overleg met je arts of je een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Het is belangrijk dat je kind de vaccinaties tegen meningokokken krijgt. Dit is vooral belangrijk voor kinderen tussen 1 en 4 jaar en jongeren vanaf 14 jaar. Zij lopen namelijk extra risico op een besmetting met meningokokken.

Meer weten?

Heb je vragen of twijfels over het vaccineren van je kind? Overleg dan met de jeugdarts, je arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Of kijk voor meer informatie op apotheek.nl, thuisarts.nl of rijksvaccinatieprogramma.nl. Wil je een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

Colofon Deze informatie komt van de Nederlandse Medicijnautoriteit **CBG** en apothekersvereniging **KNMP** in samenwerking met het **RIVM**. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor de volledige informatie over deze prik de officiële bijsluiter en volg de adviezen van je arts. Laatst gewijzigd: 17 november 2026.